

供立即發布：2022年3月31日

聯絡：HCA 通訊

HCAComm@ochca.com
(714) 834-2178

第二批 COVID-19 mRNA 加強劑現已獲准用於某些群體，CDC 的預防性隔離和治療性隔離計算器可在 OC COVID-19 網站上使用，鼓勵患有 COVID-19 的居民在有條件的地方尋求治療

(加利福尼亞州聖安娜市) - 3月30日，美國疾病控制和預防中心發布了對某些人接種 Moderna (SpikeVax) 和輝瑞 (Comirnaty) COVID-19 疫苗第二次加強劑量的更新建議。第二次加強劑量預計將在整個奧蘭治郡提供，包括奧蘭治郡衛生保健機構的 COVID-19 流動診所。

第二次加強劑的劑量將與第一次加強劑的劑量相同。疾病預防控制中心的最新指導意見擴大了以下人員獲得 Moderna 或 Pfizer 疫苗第二批加強劑的資格，即在第一批加強劑後至少 4 個月進行接種：

- 50 歲及以上的人
- 12-49 歲的中度或重度免疫力低下的人
- 18-49 歲的人，接受了 Janssen (Johnson & Johnson) 疫苗的主要係列和加強劑量的人。

"第二次加強劑量是為了進一步降低某些人的嚴重疾病風險，包括那些老年人或免疫力低下的人，"郡衛生官員 **Regina Chinsio-Kwong 醫生** 說。"我們要鼓勵任何符合條件的人接種第二次加強劑和所有其他經批准的 COVID-19 疫苗的劑量，並鼓勵他們這樣做。疫苗接種和加強劑被證明是安全的，有助於提供保護，防止嚴重感染和住院。"

任何有資格接種任何批准劑量的 COVID-19 疫苗的人都可以到 covidvaccinefacts.com 了解更多關於在哪裡可以找到 COVID-19 疫苗的信息。

奧蘭治郡的 COVID-19 病例和住院人數繼續下降。數據繼續顯示，大多數因 COVID-19 而住院的人都沒有接種疫苗。欲了解更多關於 COVID-19 的信息和資源，包括奧蘭治郡的病例數、疫苗接種和檢測，請訪問 ohealthinfo.com/covid。

COVID-19 預防性隔離和治療性隔離計算器

疾病預防控制中心最近創建了一個 COVID-19 預防性隔離和治療性隔離計算器，以幫助人們確定他們是否需要預防性隔離、治療性隔離，或採取其他預防措施，以防止傳播 COVID-19。該工具現在可以在奧蘭治郡衛生保健機構的 COVID-19 網站上找到，網址是 ohealthinfo.com/covid。

請注意，該工具不適用於患有中度或重度疾病的 COVID-19 患者或免疫系統較弱（免疫力低下）的人 - 他們應與醫生討論何時結束治療性隔離。

這一工具也不適用於在某些場合發現的病例和密切接觸者。有孩子在 K-12 學校或早期護理和教育 (ECE) 項目就讀的家長應向項目管理員諮詢其學校或 ECE 環境中的具體治療性隔離和預防性隔離指導。關於高危人群環境和醫療機構的治療性隔離和預防性隔離信息，請點擊 [這裡](#) 參考 CDC 的預防性隔離和治療性隔離指南。

關於 COVID-19 治療方法的最新情況

加利福尼亞州最近發出警報，告知該州已不再有 COVID-19 治療藥物的有限供應。鼓勵有疾病進展風險的輕度至中度 COVID-19 的門診病人與醫療服務提供者討論他們是否有資格接受治療，以及他們在哪裡可以找到治療。此外，中度至重度免疫力低下且可能對 COVID-19 疫苗接種的免疫反應不足的人，可尋求使用 Evusheld 進行暴露前預防。

通過聯邦政府的 "先檢測再治療" 倡議，某些地方的 "先檢測再治療" 站點可以在同一地點提供 COVID-19 檢測和免費治療。有關 "先檢測再治療" 倡議的更多信息，請點擊 [這裡](#)。

關於加州公共衛生局的 COVID-19 治療的更多信息，請點擊 [這裡](#)。

###